

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Sinupret forte apvalkotās tabletes

Genciānas sakņu pulveris (*Gentianae radix*)

Gaiļbiksišu ziedu pulveris (*Primulae flos*)

Dārza skābeņu lakstu pulveris (*Rumicis herba*)

Melnā plūškoka ziedu pulveris (*Sambuci flos*)

Verbēnas lakstu pulveris (*Verbena herba*)

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārststs vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 7–14 dienām nejūtāties labāk vai jūtāties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Sinupret forte un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Sinupret forte lietošanas
3. Kā lietot Sinupret forte
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Sinupret forte
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Sinupret forte un kādam nolūkam tās/to lieto

Sinupret forte apvalkotās tabletes ir augu izcelsmes zāles, ko lieto biezu gлотu šķidrināšanai un kā palīglīdzekli deguna blakusdobumu akūta iekaisuma (sinusīta) vai hroniska simusīta paasinājuma gadījumā.

2. Kas Jums jāzina pirms Sinupret forte lietošanas

Nelietojiet *Sinupret forte* šādos gadījumos:

- ja Jums ir alergīja pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja simptomi saglabājas ilgāk nekā 7 – 14 dienas, pastiprinās vai periodiski atkārtojas, kā arī tad, ja rodas elpas trūkums, drudzis vai strutainas krēpas, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu.

Ja ir zināms, ka pacientam ir gastrīts šīs zāles jālieto īpaši piesardzīgi.

Bērni un pusaudži

Nav pietiekamas informācijas par šo zāļu lietošanu bērniem vecumā līdz 12 gadiem.

Tāpēc *Sinupret forte* apvalkotās tabletes nedrīkst lietot bērniem vecumā līdz 12 gadiem.

Citas zāles un Sinupret forte

Līdz šim nav zināma mijiedarbība ar citām zālēm.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, tai skaitā par zālēm, kas iegādātas bez receptes.

Sinupret forte kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Nav norādījumu.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Tāpat kā citas zāles, arī Sinupret forte grūtniecības laikā drīkst lietot tikai tad, ja ārstējošais ārsts ir rūpīgi izvērtējis to radīto risku un sniegtu ieguvumu. Sinupret forte apvalkotās tabletēs nedrīkst lietot barojot bērnu ar krūti.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Īpaša piesardzība nav nepieciešama.

Sinupret forte satur glikozi, lakozi, saharozi un sorbītu

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Sinupret forte

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja nav norādīts citādi, ieteicamā deva ir šāda.

Vecums	Reizes deva – 3 reizes dienā	Kopējā dienas deva
Pusaudži vecumā no 12 līdz 18 gadiem un pieaugušie:	1 apvalkotā tablete	3 apvalkotās tabletēs

Nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem, jo trūkst pietiekamu datu.

Lietošanas veids

Sinupret forte apvalkotās tabletēs jānorij veselas, tās nesakošķājot un uzdzerot nelielu šķidruma daudzumu (vēlams glāzi ūdens). Pacientiem ar jutīgu kuņķi *Sinupret forte* ieteicams lietot pēc ēšanas.

Ārstēšanas ilgums

Sinupret forte apvalkoto tabletēs nedrīkst lietot ilgāk par 7–14 dienām. Lūdzu, izlasiet informāciju, kas norādīta punktā par piesardzību lietošanā.

Ja esat lietojis *Sinupret forte* apvalkotās tabletēs vairāk, nekā noteikts

Ja esat lietojis *Sinupret forte* apvalkotas tabletēs vairāk, nekā noteikts, konsultējieties ar ārstējošo ārstu. Pārdozēšanas gadījumā zemāk minētās blakusparādības var izpausties spēcīgāk.

Pārdozēšanas ārstēšana: pārdozēšanas gadījumā jāveic simptomātiska ārstēšana.

Ja esat aizmirjis lietot *Sinupret forte* apvalkotās tabletēs

Ja esat lietojis mazāk *Sinupret forte* apvalkoto tablešu, nekā vajadzētu, vai esat aizmirjis par *Sinupret forte* apvalkotās tabletēs lietošanu, lūdzu, nākamajā reizē nelietojiet dubultu devu, bet turpiniet zāļu lietošanu tā, kā noteicis ārsts vai kā aprakstīts lietošanas instrukcijā.

Ja pārtraucat lietot Sinupret forte apvalkotās tabletēs

Sinupret forte apvalkoto tablešu lietošanas pārtraukšana parasti neizraisa sarežģījumus.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Nevēlamo blakusparādību novērtēšanai ir izmantota šāda biežuma klasifikācija:

- loti bieži ($\geq 1/10$);
- bieži (no $\geq 1/100$ līdz $< 1/10$);
- retāk (no $\geq 1/1000$ līdz $< 1/100$);
- reti (no $\geq 1/10\,000$ līdz $< 1/1000$);
- loti reti ($< 1/10\,000$);
- nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Retāk (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 100).

Gremošanas traucējumi (piemēram, sāpes vēderā, slikta dūša).

Reti (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 1000).

Vietējas paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, izsитumi, eritēma, nieze.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Alerģiskas reakcijas, piemēram, lūpu, mēles un rīkles, un/vai balsenes pietūkums ar elpcēļu sašaurināšanos (angioedēma), elpas trūkums, sejas tūska.

Rodoties pirmajām paaugstinātās jutības vai alerģiskas reakcijas pazīmēm, Sinupret forte apvalkotas tabletēs nedrīkst lietot atkārtoti.

Zīnošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Sinupret forte

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc "Derīgs līdz"/ "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30° C.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sinupret forte satur

Viena apvalkotā tablete satur:

- *Aktīvās vielas:*

12 mg genciānas (*Gentiana lutea L.*) sakņu pulvera (*Gentianae radix*);

36 mg gaiļbiksīšu (*Primula veris L.*, *Primula elatior (L.) Hill.*) ziedu pulvera (*Primulae flos*);

36 mg dārza skābeņu (*Rumex acetosa L.*, *Rumex acetosella L.*, *Rumex crispus L.*, *Rumex obtusifolius L.*, *Rumex patientia L.*, *Rumex thrysiflorus* FINGERH) lakstu pulvera (*Rumicis herba*);

36 mg melnā plūškoka (*Sambucus nigra L.*) ziedu pulvera (*Sambuci flos*);

36 mg verbēnas (*Verbena officinalis L.*) lakstu pulvera (*Verbenae herba*).

- *Citas sastāvdaļas:*

Vara hlorofilīns (E 141)

Kalcija karbonāts (E170)

Rīcinella, rafinēta

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Attīrīts ūdens

Bāzisks butilēts metakrilāta kopolimērs

Želatīns

Glikoze, šķīdums

Indigokarmīns (E132)

Alumīnija hidroksīds

Laktozes monohidrāts

Vieglais magnija oksīds

Kukurūzas ciete

Dekstrīns

Kalnu vasks

Kartupeļu ciete

Riboflavīns (E 101)

Šellaka

Sorbīts

Stearīnskābe

Saharoze

Talks

Titāna dioksīds E171

Sinupret forte ārējais izskats un iepakojums

Apaļas, abpusēji izliektas, gludas, zaļas apvalkotās tabletēs.

Pieejami iepakojumi blisteros ar 20, 50 un 100 apvalkotajām tabletēm.

Papildinformācija

1 apvalkotajā tabletē ir 0,03 oglīdrātu maizes vienības (MV).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

D-92318 Neumarkt

Vācija

tālr.: +49-9181-23190

fakss: +49-9181-231265

e-pasts: info@bionorica.de

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

BIONORICA SE

Pārstāvniecība Latvijā

Ūdens 12-41, Rīga,

LV-1007, Latvija

Tālr. +371 67374153
e-pasts: bionorica@apollo.lv

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2016

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē <http://www.zva.gov.lv>